



โรคไข้นหนู

Leptospirosis



เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในฉี่ของหนู โด กระบือ สุนัข สุนัข ติดต่อจากสัตว์สู่คน ที่ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย จากทางเดินอาหาร น้ำดื่ม และรอยแผลตามผิวหนัง

คนติดโรคได้อย่างไร ?

ติดต่อทางตรงและทางอ้อม



การสัมผัส ปัสสาวะหรือ อวัยวะของสัตว์ติดเชื้อ



เดินลุยน้ำ ลงแช่น้ำ ย่ำดิน โคลน ที่มีเชื้อปนเปื้อน

อาการ

มีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่น่องและ โคนขา คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ตาแดง

⊘ หากมีไข้ (หลังลุยน้ำ 1 - 2 สัปดาห์) ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่ น่อง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที



วิธีป้องกันโรคไข้นหนู

ผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

เกษตรกร ชาวนา สัตว์แพทย์ ชุมชนแออัด



ยึดหลัก 3 กำจัด

1. กำจัดหรือดักหนูด้วยวิธีต่าง ๆ
2. กำจัดแหล่งอาหารของหนู
3. กำจัดที่อยู่อาศัยของหนู



- ▶ หลีกเลี่ยงการทำงานในน้ำ หรือ เดินลุยโคลนลุยน้ำ เป็นเวลานาน
- ▶ ขณะปฏิบัติงานสวมชุดป้องกันไม่ให้ เชื้อโรคเข้าสู่ผิวหนัง เช่น รองเท้าบูท
- ▶ รีบทำความสะอาดร่างกายโดยเร็ว หากลงไปในพื้นที่น้ำ
- ▶ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ อาหารที่เหลือเก็บใส่ภาชนะที่มิดชิด